

CALENDRIER DES INTERDICTIONS D'EPANDAGE SELON LA CULTURE



épandage autorisé



épandage interdit

		J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J
Sols non cultivés et légumineuses (sauf légumes)	Type I : C/N > 8	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	Type II : C/N ≤ 8	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	Type III : azote minéral	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Grandes cultures d'automne	Type I : C/N > 8	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	Type II : C/N ≤ 8	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green
	Type III : azote minéral	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green
Grandes cultures de printemps avec CIPAN	Type I : C/N > 8	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	Type II : C/N ≤ 8	Green	Green	Green	(1)	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green
	Type III : azote minéral (2)	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green
Grandes cultures de printemps sans CIPAN	Type I : C/N > 8	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	Type II : C/N ≤ 8	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green
	Type III : azote minéral (2)	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green
Prairies de plus de six mois	Type I : C/N > 8	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	Type II : C/N ≤ 8	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green
	Type III : azote minéral	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green
Graminées porte-graines (3)	Type I : C/N > 8	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	Type II : C/N ≤ 8	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green
	Type III : azote minéral	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green
Légumes	Type I : C/N > 8	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green
	Type II : C/N ≤ 8	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green
	Type III : azote minéral	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green

(1) Épandage interdit après le 15/10 sur les sols avec un taux d'argile supérieur à 30 % ou sur les parcelles inondables.

(2) Sur culture de printemps irriguée, si fractionnement des apports de fertilisants de type III, les apports d'azote minéral sont possibles jusqu'au 14/07.

(3) Les apports de fertilisants de type III sur les cultures de graminées porte-graines en septembre ou octobre, décidés en cas de besoin, n'excèdent en aucun cas 60 unités d'azote par hectare.

type I (C/N > 8)		type II (C/N ≤ 8)		type III
- Fumiers bovin et ovins	- Fumiers de volailles	- Lisiers de porc	- Fientes de volailles	- Sulfates d'ammonium issus des industries chimiques - Engrais de synthèse
- Lisier pailleux	- Boues de papeterie	- Boues liquides urbaines et industrielles	- Lisiers de bovin	
- Fumier de champignonnière	- Vinasses concentrées	- Purins	- Eaux brunes et blanches	
- Composts de fumier, de déchets verts et de fraction fermentescible des ordures ménagères	- Écumes de défécation			
C/N à déterminer par le producteur				
- Boues urbaines et industrielles déshydratées		- Autres effluents		
- Digestat de méthanisator				

La CIPAN (Culture Intermédiaire Piège A Nitrates) doit être implantée au plus tard le 10 septembre.

Effluents de type I : Épandage possible dans le mois précédent l'implantation d'une CIPAN ou sur CIPAN implantée

Effluents de type II : Implantation CIPAN antérieure ou simultanée à l'épandage

CALENDRIER DES INTERDICTIONS D'EPANDAGE SELON LE TYPE DE FERTILISANT

 épandage autorisé  épandage interdit

OCCUPATION DU SOL	Type I : C/N > 8											
	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J
Sols non cultivés et légumineuses (sauf légumes)	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Grandes cultures d'automne	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Grandes cultures de printemps avec CIPAN	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Grandes cultures de printemps sans CIPAN	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Prairies de plus de six mois	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Graminées porte-graines	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Légumes	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green

OCCUPATION DU SOL	Type II : C/N ≤ 8											
	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J
Sols non cultivés et légumineuses (sauf légumes)	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Grandes cultures d'automne	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Grandes cultures de printemps avec CIPAN	Green	Green	Green	(1)	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Grandes cultures de printemps sans CIPAN	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Prairies de plus de six mois	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Graminées porte-graines	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Légumes	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green

OCCUPATION DU SOL	Type III : azote minéral											
	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J
Sols non cultivés et légumineuses (sauf légumes)	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Grandes cultures d'automne	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Grandes cultures de printemps avec ou sans CIPAN (2)	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green
Prairies de plus de six mois	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Graminées porte-graines (3)	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Légumes	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green

(1) Épandage interdit après le 15 octobre sur les sols avec un taux d'argile supérieur à 30 % ou sur les parcelles inondables

(2) Sur culture de printemps irriguée, si fractionnement des apports de fertilisants de type III, les apports d'azote minéral sont possibles jusqu'au 14 juillet.

(3) Les apports de fertilisants de type III sur les cultures de graminées porte-graines en septembre ou octobre, décidés en cas de besoin, n'excèdent en aucun cas 60 unités d'azote par hectare.

type I (C/N > 8)	type II (C/N ≤ 8)	type III
- Fumiers de bovin et d'ovin - Lisier pailleux - Fumier de champignonnière - Écumes de défécation - Composts de fumier, de déchets verts et de fraction fermentescible des ordures ménagères	- Fumiers de volailles - Boues de papeterie - Vinasses concentrées - Lisiers de porc - Fientes de volailles - Boues liquides urbaines et industrielles - Lisiers de bovin - Purins - Eaux brunes et blanches	- Sulfates d'ammonium issus des industries chimiques - Engrais de synthèse
C/N à déterminer par le producteur		
- Boues urbaines et industrielles déshydratée - Digestat de méthanisation - Autres effluent		

CIPAN (Culture Intermédiaire Piège A Nitrates) obligatoire avant grande culture de printemps :

- si épandage d'un produit de type I en juillet-août
- si épandage d'un produit de type II en juillet-août-septembre-octobre
- pour atteindre le taux de couverture automnal de 70%

La CIPAN doit être implantée au plus tard le 10 septembre.

Effluents de type I : Épandage possible dans le mois précédent l'implantation d'une CIPAN ou sur CIPAN implantée

Effluents de type II : Implantation CIPAN antérieure ou simultanée à l'épandage